

Sygdomstegn hos kaniner

Er min kanin syg – hvad betyder symptomet?

Dette er ikke en fyldestgørende afdækning af sygdomme hos kaniner. Det kan jeg ikke give, da jeg ikke er dyrlæge. Skemaet er udarbejdet ud fra min egen erfaring med og mit teoretiske kendskab til kaniner

Jeg håber at skemaet kan være til hjælp

Videre >>

Klik på det symptom din kanin har

- Øjenbetændelse
- Diarre
- Myggestik
- Usund pels
- Snottet kanin
- Skrigende kanin
- Skærer tænder
- Ligger uden at reagere
- Blødning fra kropsåbninger
- Høj puls
- Nysen
- Knude
- Hvide pupiller
- Kaninen sidder skævt
- Gul i det hvide af øjnene
- Bid
- Balanceproblemer
- Belægninger i ørerne
- Blod i urinen
- Appetitløshed
- Tynd kanin
- Udspilet bug
- Drikker meget/lidt
- Stereotype bevægelser
- Savlen
- Forvoksede tænder
- Kraftig/hyppig kradsen
- Kriblen-krablen i pelsen

Øjenbetændelse

Er der pus i øjet/øjnene?

Ja

Nej

Øjenbetændelse

Er kaninen også snottet?

Ja

Nej

Øjenbetændelse

Vask øjnene med sterilt saltvand, der købes i pipetter på apoteket eller hos Matas

Det skal blive betragteligt bedre indenfor 2 døgn ellers bør dyrlægen kontaktes

Tilbage til oversigten >>

TAG TIL DYRLÆGEN OMGÅENDE

Tilbage til oversigten >>

Øjenbetændelse og snottet

At en kanin er snottet og har pus i øjnene er alvorligt. Dette kan være tegn på den frygtede kaninpest (Myxomatose). Kaninpest forekommer om efteråret, men snot er altid alvorligt.

Derfor ring til dyrlægen omgående

[Tilbage til oversigten >>](#)

Øjenbetændelse

Er det et tilbagevendende problem?

Ja

Nej

Øjenbetændelse

Dyrlægen bør undersøge om det eventuelt er problemer med tandstillingen eller med allergi, der er skyld i øjenbetændelserne

Videre >>

Øjenbetændelse

Har kaninen fået træk?

Ja

Nej

Øjenbetændelse

Kaniner kan ikke tåle at få træk, så du bør ændre bur og/eller løbegård, så det ikke sker igen

Videre >>

Øjenbetændelse

Har du fornyligt købt nyt hø, halm eller skiftet strøelse?

Ja

Nej

Øjenbetændelse

Særligt i forsommeren kan det nyslåede forårshø være hårdt for kaninernes sarte slimhinder i øjne og næse

Det er en god idé at købe noget varmebehandlet hø (vacumpakket) som kaninen kan få. Det er som regel kun første høst der giver problemer

Videre >>

Diarre

Er afføringen blød men formfast og formet som en pølse af små kugler?

Ja

Nej

Diarre

Din kanin er ikke syg. Det du oplevet er den del af afføringen der fungerer som kaninens vitamintilskud. Normalt spiser kaninen det med det samme, men af og til får det lov at blive liggende

Tilbage til oversigten >>

Diarre

Virker kaninen sløj og apatisk

Ja

Nej

Diarre

Dehydrering er en alvorlig og akut tilstand. Kaninen skal have væske under huden for at give den en chance for at overleve.

I nogle tilfælde kan kaninen klare sig med sukkervand i en pipette, men det er langt fra sikkert at det er nok og der er ikke tid til at prøve sig frem.

Videre >>

Diarre

Er kaninen lige flyttet – eller har I fået et nyt kæledyr?

Ja

Nej

Diarre

Diarre kan være et stresssymptom. Sørg for at kaninen får ro til at falde til. Placer gerne dens bur lidt højt, så den bedre kan overskue tingene og så den ikke er placeret langt under jer og andre kæledyr.

Videre >>

Diarre

Tag alt grønt og tørkost fra kaninen, så den kun har hø og vand, som den tilgængæld som altid har i rigelige mængder. Giv gerne Zoo-Lac, Fibre-plex/Fibre-pro, der kan købes hos dyrlægen og i nogle dyrehandlere. Afføringen skal normaliseres indenfor 2-3 dage. Først når afføringen er helt normaliseret gives tørkost blandet med havregryn i tiltagende mængder. Når maven er stabil på tørkost kan den igen få grønt, men det skal gradvist trappes op i mængden.

[Tilbage til oversigten>>](#)

Diarre

Har kaninen fået uvant grønt eller været længe på græs?

Ja

Nej

Diarre

Kaniners maver er sarte og de tåler ikke bratte foderskift.

Alle foderskift skal foregå gradvist

Videre>>

Myggestik

Er det august, september eller oktober?

Ja

Nej

Myggestik

Kaninpest udvikler sig bl.a. efter stik af en inficeret myg i disse måneder.

Hvis kaninen bliver snottet, får øjenbetændelse og/eller hævede slimhinder 3-5 dage efter stikket så kontakt omgående dyrlægen.

Tilbage til oversigten >>

Myggestik

Er der hævelse og rødme, der breder sig eller har kaninen feber?

Ja

Nej

Myggestik

Rødme, hævelse og feber er tegn på at kaninen har en infektion. Den skal til dyrlægen og behandles.

[Tilbage til oversigten >>](#)

Myggestik

Så længe der ikke er rødme og hævelse eller feber er der ingen grund til bekymring

Tilbage til oversigten >>

Usund pels

Er der forår eller efterår og mister kaninen pels når du nusser den, men er ellers tør i pelsen?

Ja

Nej

Usund pels

Din kanin er formentlig bare i fæld det kan se voldsomt ud. Sørg for at den får mad og vand nok og at den har masser af halm i buret

[Tilbage til oversigten >>](#)

Usund pels

Har kaninen fedtede plamager i pelsen, hvori håret sidder løst?

Ja

Nej

Usund pels

Der findes parasitter som kaniner kan have i pelsen. Det generer kaninen og smitter, så din kanin bør et smut til dyrlægen og blive undersøgt og behandlet

Tilbage til oversigten >>

Usund pels

Er kaninen 3-8 måneder gammel?

Ja

Nej

Usund pels

Din kanin er nok blevet kønsmoden. Mange kaniner bliver stressede af deres første møde med hormonerne. Hvis det er en hun og det er tilbagevendende eller det er en han og det bliver ved, så snak med dyrlægen og, hvorvidt det ville være bedst at få kaninen neutraliseret

Tilbage til oversigten >>

Usund pels

Er kaninen lige flyttet – eller har I fået et nyt kæledyr?

Ja

Nej

Usund pels

Diarre kan være et stresssymptom. Sørg for at kaninen får ro til at falde til. Placer gerne dens bur lidt højt, så den bedre kan overskue tingene og så den ikke er placeret langt under jer og andre kæledyr.

Tilbage til oversigten >>

Usund pels

Usund pels kan skyldes flere ting bl.a. påvirkning af indre organer. Da kaniner er meget renlige dyr vil det nærmest aldrig skyldes sjusk med renligheden og derfor bør det undersøges nærmere, hvis det ikke bedres hurtigt.

Oftest skyldes det stress og derfor skal du overveje om der er noget der kan stresse den

Tilbage til oversigten >>

Snottet kanin

Det er alvorligt!

Snot hos en kanin er symptom på flere af de farligste sygdomme hos kaniner herunder kaninpest. Uanset hvad det skyldes så skal det vurderes og behandles omgående

Tilbage til oversigten >>

Skrigende kanin

Det er alvorligt!

En skrigende kanin har voldsomme smerter og skal til dyrlægen øjeblikkelig. Den har måske brækket et ben og skal aflives akut

Tilbage til oversigten >>

Skærer tænder

Er det noget kaninen gør hver gang du sidder og nusser med den og ellers ikke?

Ja

Nej

Skærer tænder

Din kanin nyder dit selskab

[Tilbage til oversigten >>](#)

Skærer tænder

Det kan være alvorligt!

En kanin der skærer tænder kan have store smerter og bør til dyrlægen øjeblikkelig. Den kan også have en fejlstilling i tænderne, der skal tilses

Tilbage til oversigten >>

Ligger uden at reagere

Det er alvorligt!

Det kan skyldes flere ting bl.a. dehydrering, hedeslag og organsvigt, men det er et tegn på at kaninen er tæt på at dø. Så den skal til dyrlæge omgående

Tilbage til oversigten >>

Blødning fra kropsåbninger

Det er alvorligt!

Det kan skyldes den frygtede kaninsygdom VHD
kontakt dyrlægen omgående også selvom din
kanin allerede er død

Tilbage til oversigten >>

Høj puls

Er kaninen nervøs?

Ja

Nej

Høj puls

Det er helt normalt at kaninen får høj puls hvis den er nervøs.

Hvis den er blevet skræmt over noget så berolig den

Hvis du lige har fået den hjem, så giv den god til til at finde sig tilrette i sit nye bur og få tillid til dig

[Tilbage til oversigten >>](#)

Høj puls

Det kan være alvorligt!

Hvis pulsen ikke falder med det samme igen, så bør du kontakte dyrlægen

Tilbage til oversigten >>

Nysen

Er kaninen snottet? - Kig evt på indersiden af forbenene om pelsen der er klistret, er den det, så ER den snottet

Ja

Nej

Nysen

Har I lige skiftet hø eller strøelse?

Ja

Nej

Nysen

Særligt i forsommeren kan det nyslåede forårshø være hårdt for kaninernes sarte slimhinder i øjne og næse

Det er en god idé at købe noget varmebehandlet hø (vacumpakket) som kaninen kan få. Det er som regel kun første høst der giver problemer
Hvis hø og/eller strøelse er støvet må det ikke bruges

[Tilbage til oversigten >>](#)

Nysen

Er det forsommer?

Ja

Nej

Nysen

Din kanin kan have pollen-allergi.
Prøv at lade den flytte ind hvis det er en udekanin
og se om det hjælper. Sørg for at hø, mad og
strøelse opbevares, så det er fri for pollen.

Hvis det fortsætter eller forværres, så kontakt
dyrlægen

[Tilbage til oversigten >>](#)

Nysen

Prøv at fjerne halm og spåner fra buret og erstat med spaghnum – måske kan din kanin ikke tåle det.

Der er også kaniner der ikke kan tåle hø, hvis det er tilfældet, så skal du sørge for at kaninen får andet slibemateriale (grene) og andet fibertilskud (f.eks. Fibrepro, der kan købes hos dyrlægen eller i nogle dyrehandlere)

Hvis ikke det afhjælper problemet eller det bliver værre, så kontakt dyrlægen

[Tilbage til oversigten >>](#)

Knude

Hvor sidder knuden?

Maven

Ved dievorte

Andet sted

Knude

Kan kaninen have været drægtig på et tidspunkt?
Og sidder knuden dybt og er flytbar?

Ja

Nej

Knude

Det sker at et foster eller ufødt kaninunge går til grunde og bliver inde i moderen. Typisk indkapsles den, så den ikke laver ravage.

Hvis kaninen har andre symptomer eller hvis knuden vokser så kontakt dyrlægen

[Tilbage til oversigten >>](#)

Knude

Sidder den lige under huden?

Ja

Nej

Knude

Det kan tænkes at kaninen har en infektion under huden efter bid eller andet sår og det bør undersøges hos dyrlægen.

Tilbage til oversigten >>

Knude

Jeg har intet godt bud – Det bør undersøges hos dyrlægen.

Tilbage til oversigten >>

Knude

Det bør undersøges af dyrlægen. Det kan dreje sig om en svulst en hævet mælkekirtel eller brystbetændelse, så det kan meget vel tænkes at det skal behandles

Tilbage til oversigten >>

Hvide pupiller

Kaninen er blind og det er derfor vigtigt at den ikke skifter bur unødigt – God idé at bur og løbegård er samlet, så den ved hvor den er.

Tilbage til oversigten >>

Kaninen sidder skævt

Er dens negle for lange?

Ja

Nej

Kaninen sidder skævt

Kaninens negle vokser hele livet og skal klippes med jævne mellemrum – Det er til stor gene for kaninen, hvis den har for lange negle

[Tilbage til oversigten >>](#)

Kaninen sidder skævt

Holder den også hovedet skævt?

Ja

Nej

Kaninen sidder skævt

Det kan være alvorligt!

Kaninen bør til dyrlæge og undersøges, den kan bl.a. have mellemørebetændelse, virus på balancenerven eller en hjerneskade

Tilbage til oversigten >>

Kaninen sidder skævt

Jeg har intet godt bud – Det bør undersøges hos dyrlægen.

Tilbage til oversigten >>

Gul i det hvide i øjnene

Skyldes leverpåvirkning og skal undersøges af
dyrlægen

Tilbage til oversigt >>

Bid

Gaber hullet?

Ja

Nej

Bid

Der er stor risiko for infektion, så det er fornuftigt at kontakte dyrlægen.

Videre >>

Bid

Forholdsregler ved sår

Hold kaninen fra kontakt med jord

- Skift buret daglig
- Vask med sterilt saltvand
- Hold huden bevægelig
- Kontroller dagligt for infektion og spy og kontakt dyrlægen omgående ved mistanke

Tilbage til oversigten >>

Balanceproblemer

Det kan være alvorligt!

Kaninen bør til dyrlæge og undersøges, den kan bl.a. have mellemørebetændelse, virus på balancenerven eller en hjerneskade

Tilbage til oversigten >>

Belægninger i ørerne

Hvis kaninen har belægninger i ørerne, der ikke lige kan vaskes af, så bør det undersøges hvad det er hos dyrlægen.

Tilbage til oversigten >>

Blod i urinen

Urinen farves rød/orange hvis kaninen spiser meget grønt – dette gør mange urolige.

Hvis der reelt er blod i urinen, så ring til dyrlægen

Tilbage til oversigten >>

Appetitløshed

Spiser kaninen SLET ikke og kan heller ikke
nødes til grønt?

Jo

Nej

Appetitløshed

Er det en højdrægtig hun?

Ja

Nej

Appetitløshed

Det er ganske normalt at hunner nærmest ikke rører mad de sidste dage inden fødslen.

Tilbage til oversigten >>

Appetitløshed

Er kaninen lige flyttet?

Ja

Nej

Appetitløshed

Det er helt naturligt at kaninen lige skal falde til i sine nye omgivelser – Husk at ændre dens kost gradvist

Tilbage til oversigten >>

Appetitløshed

Prøv at lokke kaninen til at spise med alle dens livretter.

Hvis det ikke bedres hurtigt, så bør det undersøges af dyrlægen.

Tilbage til oversigten >>

Appetitløshed

Det er alvorligt!

Du skal kontakte dyrlægen omgående hvis en kanin ikke spiser svigter organerne, det kan ske så tidligt som efter 1½ døgn.

Tilbage til oversigten >>

Tynd kanin

Er det en ældre kanin (over 5 år)

Ja

Nej

Tynd kanin

Mange kaniner bliver tyndere og skarpere over ryggen når de kommer op i alderen – Det betyder intet i sig selv

Tilbage til oversigten >>

Tynd kanin

Spiser kaninen som den skal og har den fri adgang til hø?

Ja

Nej

Tynd kanin

Der er en risiko for at kaninen har orm, parasitter, infektion eller lidelse i tarmen – Det er en god idé at få det undersøgt, hvis det ikke vender hurtigt.

[Tilbage til oversigten >>](#)

Tynd kanin

Kaniner skal altid have adgang til hø, så hvis ikke din kanin har det så kan det være problemet

Hvis kaninen er småtspisende, så Prøv at lokke kaninen til at spise med alle dens livretter.

Hvis det ikke bedres hurtigt, så bør det undersøges af dyrlægen.

[Tilbage til oversigten >>](#)

Udspilet bug

Virker kaninen syg?

Ja

Nej

Udspilet bug

Har kaninen været længe på græs eller på anden vis fået meget grønt

Ja

Nej

Udspilet bug

Giv kaninen frisk ananassaft med pipette og prøv at få den til at bevæge sig. Kan det ikke lade sig gøre eller bliver det ikke med det samme bedre, så er det meget alvorligt og den skal til dyrlæge øjeblikkeligt.

Det kan dreje sig om forstoppelse eller tarmgasser og begge dele skal behandles hurtigt

[Tilbage til oversigten >>](#)

Udspilet bug

Udspilet bug kan skyldes flere alvorlige tarmlidelser og skal derfor tages alvorligt. Når den virker syg, så bør den til dyrlæge hurtigt.

[Tilbage til oversigten >>](#)

Udspilet bug

Kan skyldes mange normale ting bl.a. drægtighed, og luft i maven og flere alvorlige tarmlidelser. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på om den bliver sløj, for bliver den det, så er det nødvendigt at reagere hurtigt

Tilbage til oversigten >>

Drikker meget/lidt

Det er meget forskelligt hvor meget kaniner drikker. Jeg har dværgkaniner og enkelte drikker nærmest intet imens andre drikker ½ liter om dagen – begge dele er helt normalt

Drikker din kanin pludselig meget anderledes end den plejer?

Ja

Drikker meget/lidt

Er kaninen lige flyttet, har I fået et nyt kæledyr eller andet der kan have stresset kaninen?

Ja

Nej

Drikker meget/lidt

Ændret drikketrang kan være et stresssymptom.

Sørg for at kaninen får ro til at falde til. Placer gerne dens bur lidt højt, så den bedre kan overskue tingene og så den ikke er placeret langt under jer og andre kæledyr.

Hvis det ikke normaliserer sig stille og roligt, så er det en god idé at få det undersøgt, da stresstilstanden kan skyldes hormoner eller drikketrangen kan være ændret af andre årsager.

[Tilbage til oversigten >>](#)

Drikker meget/lidt

Hvis det fortsætter, så bør det undersøges da stor drikketrang kan være et tegn på sukkersyge eller stress – stress kan meget vel hænge sammen med hormonniveauet og er det tilfældet vil jeg anbefale at give kaninen fred fra hormoner ved en neutralisering.

Tilbage til oversigten >>

Stereotype bevægelser

Hyppige parringsbevægelser, væven eller andre stereotype bevægelser skyldes oftest stress, men kan også skyldes angst eller kedsomhed.

Videre >>

Stereotype bevægelser

Sørg for at kaninen får ro fra ting der kan stresse den men giv den noget at lege med i buret og løbegården evt. foderbold, bamse eller andet. Placer gerne dens bur lidt højt, så den bedre kan overskue tingene og så den ikke er placeret langt under jer og andre kæledyr.

Dette ses ofte ved hormonbetinget stress. Det kan undersøges hos dyrlægen om det er tilfældet, i givet fald er en neutralisation det bedste for kaninen

[Tilbage til oversigten >>](#)

Savlen

Det skyldes næsten altid at kaninens tænder er forvoksede. Savlen kan også skyldes andre ting, men uanset hvad så skal den undersøges og behandles af en dyrlæge.

Videre >>

Forvoksede tænder

Kaninens tænder er forvoksede enten pga. fejlstilling eller fejlnæring. Det skal behandles hos dyrlægen ved at kaninen lægges i narkose og tænderne slibes ned. Behandlingen vil i langt de fleste tilfælde skulle gentages hver 3.-6. uge resten af kaninens liv. Det koster let 8-10.000 om året at have en kanin med tandfejl.

[Tilbage til oversigten >>](#)